



ΕΠΕΜΥ

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία

απόσυρση βιολογικών στην ΡΑ (συστ. ανασκόπηση)

6 μελέτες περιελήφθησαν στην μετανάλυση με 1927 ασθενείς με ΡΑ και , παρότι τα η ποιότητα των αποδείξεων είναι χαμηλή (level of evidence), φάνηκε ότι :

- σε σχέση με την απόσυρση του βιολογικού, η συνέχιση αυτού σχετίστηκε με **αυξημένη πιθανότητα για χαμηλή ενεργότητα νόσου** (relative risk [RR] = 0.66, 95 % CI 0.51–0.84, I² = 91 %, NNT = 4, low quality), ύφεση (0.57, 0.44–0.74, I² = 82 %, NNT = 3, low quality) και ακτινογραφική εξέλιξη
- δεν φάνηκαν σημαντικές διαφορές σχετικά με σοβαρές ΑΕ, σοβαρές λοιμώξεις, νεοπλασίες ή ευρήματα σχετικά με ευαίσθητες ή οίδηματώδεις αρθρώσεις
- σχεδόν οι μισοί ασθενείς παρέμειναν σε χαμηλή ενεργότητα νόσου μετά την απόσυρση του βιολογικού

Withdrawal of biologic agents in rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Tais Freire Galvao, Ivan Ricardo Zimmermann, Licia Maria Henrique da Mota, Marcus Tolentino Silva, Mauricio Gomes Pereira **Clinical Rheumatology** July 2016, Volume 35, Issue 7, pp 1659–1668. DOI: 10.1007/s10067-016-3285-y

