



EPEMY

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία

Κολχικίνη και καρδιαγγειακό στην ΥΑ

Η χορήγηση κολχικίνης σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα σχετίζεται με **ΜΕΙΩΣΗ των καρδιαγγειακών συμβαμάτων** σε ασθενείς με ουρική νόσο, σύμφωνα με πρόσφατη αναδρομική μελέτη στο ARD, όπου 501 ασθενείς υπό κολχικίνη συγκρίθηκαν με αντίστοιχο – συγκρίσιμο αριθμό ασθενών χωρίς κολχικίνη.

28 CV συμβάματα παρουσιάστηκαν στην 1^η ομάδα και 82 στην 2^η, σε διάρκεια παρακολούθησης 5 ετών, κάτι που σημαίνει μείωση 49% του κινδύνου για CVD

Effects of colchicine on risk of cardiovascular events and mortality among patients with gout: a cohort study using electronic medical records linked with Medicare claims. Daniel H Solomon^{1,2}, Chih-Chin Liu¹, I-Hsin Kuo¹, Agnes Zak¹, Seoyoung C Kim^{1,2} **Ann Rheum Dis** 2016;75:1674-1679 doi:10.1136/annrheumdis-2015-207984