



Καταγραφή της ενσωμάτωσης στοχευμένων ανοσοτροποποιητικών θεραπειών σε τριτοβάθμιο κέντρο ΙΦΝΕ στην εξαετία 2018-2023

Γ. Κοκκότης, Π. Μαρκόπουλος, Αικ. Γάκη, Β. Κίτσου, Κ. Χαλακατεβάκη, Μ. Γκίζης, Π. Πράπα, Γ. Μπάμιας
Γαστρεντερολογικό τμήμα Γ' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα, ΕΚΠΑ,
Αθήνα




Οι διεθνείς εταιρείες προτείνουν την top-down έναντι της step-up προσέγγιση κατά την επιλογή θεραπείας της ελκώδους κολίτιδας (ΕΚ) και της νόσου Crohn (NC)




Οι βιολογικοί παράγοντες και τα μικρά μόρια αποτελούν το βασικό πλέον κομμάτι της θεραπείας

Step up approach



Top down approach



Σκοπός της μελέτης: Να περιγραφεί η διαχρονική τάση χορήγησης των στοχευμένων ανοσοτροποποιητικών θεραπειών σε ένα εξειδικευμένο κέντρο Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών νοσημάτων του Εντέρου (ΙΦΝΕ).




Μέθοδοι

Αναδρομική μελέτη παρατήρησης

Διάστημα: Ιανουάριος 2018 – Δεκέμβριος 2023

Κέντρο: μονάδα ΙΦΝΕ του ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία».

Πληθυσμός: Ασθενείς με ΕΚ ή ΝC που έλαβαν τουλάχιστον μια δόση:



Βιολογικού παράγοντα

Infliximab
Vedolizumab
Ustekinumab

Μικρού μορίου

Tofacitinib
Upadacitinib



Πληθυσμός της μελέτης

➤ 475 ασθενείς

➤ Ηλικία: 39 έτη (17-87)

➤ Άνδρες: 51.4%

➤ ΕΚ: 53.1%


➤ Διάρκεια νόσου: 8 έτη (1-43)



Ο αριθμός των ασθενών που έλαβαν τουλάχιστον μια δόση προχωρημένης αγωγής αυξήθηκε από **96 το 2018** σε **385 το 2023**

Διάμεση αύξηση ανά έτος 32.1%
(28-37.5%)

Ασθενείς που έλαβαν τον παράγοντα






Ο αριθμός των ασθενών που ξεκίνησαν προχωρημένη αγωγή αυξήθηκε από **51 το 2018** σε **132 το 2023**


Αύξηση κατά 235%

Ασθενείς που ξεκίνησαν τον παράγοντα





Ιστορικό έκθεσης σε βιολογικούς παράγοντες ανά θεραπεία



	Infliximab	Vedolizumab	Ustekinumab	Tofacitinib	Upadacitinib
0	57%	76%	30%	0%	0%
1	34%	18%	51%	32%	14%
2+	10%	6%	18%	68%	86%



Συμπεράσματα

- Τα τελευταία έξι έτη παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού ασθενών με ΙΦΝΕ που έλαβαν στοχευμένη ανοσοτροποποιητική θεραπεία.
- Το vedolizumab χρησιμοποιείται κυρίως σε παύει ασθενείς με ΙΦΝΕ
- Το ustekinumab και τα μικρά μόρια χρησιμοποιούνται κυρίως ως 2ης και 3ης γραμμής προχωρημένη θεραπεία.