



Μπορεί η βέλτιστη επικοινωνία ιατρού-ασθενούς να οδηγήσει σε καλύτερο έλεγχο της ρευματοειδούς αρθρίτιδας?



T2T CONNECT

GUIDE PATIENTS TOWARDS TIGHT DISEASE CONTROL



Λόγω φόρτου
εργασίας, ο χρόνος
επικοινωνίας με
τον ασθενή είναι
περιορισμένος



Λόγω του
διαδικτύου όλο
και περισσότεροι
ασθενείς έρχονται
«διαβασμένοι»
στο ιατρείο



T2T CONNECT

GUIDE PATIENTS TOWARDS TIGHT DISEASE CONTROL



«Δύσκολοι»
ασθενείς
χρειάζονται
ιδιαίτερους
χειρισμούς



Ερωτηματολόγιο σε 1,829 ασθενείς με ΡΑ

82%

Θέλουν περισσότερο ενημέρωση για το πώς
θεραπεύεται η νόσος τους

76%

Θέλουν περισσότερο σε βάθος συζήτηση με τον
ιατρό τους για την κατάσταση της υγείας τους

Treating Rheumatoid Arthritis to Target: Γενικές Αρχές



A) Η θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) βασίζεται σε **κοινή απόφαση** ασθενούς και ρευματολόγου.

B) Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας είναι **η μακροχρόνια βελτίωση της ποιότητας της ζωής** που σχετίζεται με τη νόσο. Αυτό επιτυγχάνεται με τον έλεγχο των συμπτωμάτων, την πρόληψη των δομικών βλαβών, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας, και την επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία.

Γ) Η **εξάλειψη της φλεγμονής** είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Δ) Το καλύτερο δυνατό τελικό αποτέλεσμα στην επίτευξη του επιθυμητού στόχου **επιτυγχάνεται με μια θεραπευτική αγωγή που μετράει συχνά την ενεργότητα της νόσου και τροποποιείται αναλόγως.**



Πως επιτυγχάνεται η βέλτιστη επικοινωνία
ιατρού-ασθενούς?

Επικοινωνία: πληροφωρώ-ακούω-
καθοδηγώ

Κινητοποιητική συνέντευξη

Επικοινωνία οφέλους/κινδύνου