


Θεραπευτικοί στόχοι στη ΝC

Πέρα από την συμπτωματική ύφεση

- ▣ Βελτίωση της ποιότητας ζωής και επαγωγή άμεσης κλινικής ανταπόκρισης
- ▣ Διατήρηση της ύφεσης χωρίς στεροειδή
- ▣ Αποφυγή επιπλοκών και μείωση των νοσηλειών και χειρουργείων
- ▣ Επίτευξη και διατήρηση της πλήρους επούλωσης του βλεννογόνου


Ταχεία επίτευξη ανταπόκρισης και ύφεσης

Εβδομάδα 4



Targan S, et al., NEJM, 1997



Παρατεταμένο κλινικό όφελος με διακοπή των κορτικοειδών




63.4%

71.2 % διέκοψε
τα στεροειδή

Ταχεία επούλωση του βλεννογόνου και ιστολογική αποκατάσταση με Infliximab




1 στους 2 ασθενείς επιτυγχάνει πλήρη επούλωση του βλεννογόνου στο 1 έτος



Αποδεικτική ισχύς των Anti-TNF παραγόντων στην επίτευξη βλεννογονικής επούλωσης

	Corporate Clinical Trials	Independent Studies and IISs	Community Cohorts
Infliximab	Targan ACCENT I SONIC	SUTD GETAID Regueiro post-op	Leuven cohort Rome cohort
Adalimumab	EXTEND		
Certolizumab	MUSIC		

Μείωση της πιθανότητας κολεκτομής σε σχέση με την αρχική ανταπόκριση



ACCENT II

Characteristic	Response and Assignment to Placebo Maintenance (N=99)	Response and Assignment to Infliximab Maintenance (N=96)	P Value*	No Response (N=87)
Disease duration — yr			0.85	
Median	12.3	10.5		11.7
Range	0.5–31.6	0.2–32.2		0.3–49.8
Concomitant medication — no. (%)				
5-Aminosalicylates (oral or rectal)	49 (49)	41 (43)	0.34	42 (48)
Mercaptopurine or azathioprine	35 (35)	29 (30)	0.44	28 (32)
Methotrexate	2 (2)	1 (1)	1.00	2 (2)
Antibiotics	26 (26)	28 (29)	0.35	29 (33)
Corticosteroids				
Any	30 (30)	25 (26)	0.51	26 (30)
>20 mg per day	8 (8)	8 (8)	1.00	7 (8)
Prior medication — no. (%)				
Antibiotics	92 (93)	92 (96)	0.38	80 (92)
Mercaptopurine or azathioprine	63 (64)	69 (72)	0.22	53 (61)
Cyclosporine or tacrolimus	7 (7)	3 (3)	0.21	7 (8)
Draining fistulas			0.58	
Median	2	2		2
Range	1–11	1–6		1–8
No. (%) with 1 fistula	42 (42)	38 (40)	0.69	43 (49)
No. (%) with >1 fistula	57 (58)	58 (60)		44 (51)

Πρόγραμμα δοσολογίας

Εβδομάδα 0,2,6: IFX 5 mg/kg.
 Εβδομάδα 14 : Εκτίμηση της ανταπόκρισης.
 Τυχοποίηση ανταποκριθέντων σε αναλογία 1:1 να λάβουν εικονικό φάρμακο ή 5 mg/kg IFX στις εβδομάδες 14, 22, 30, 38, 46.

Κύριο τελικό σημείο

- Για τους ασθενείς που ανταποκρίθηκαν την εβδομάδα 14, πόσος χρόνος μεσολάβησε έως ότου χάσουν την ανταπόκριση την εβδομάδα 54

Διάρκεια της μελέτης

54 εβδομάδες

Αποτελέσματα

Ο διάμεσος χρόνος έως τη διάρκεια της ανταπόκρισης (LoR) ήταν 14 εβδομάδες στην ομάδα συντήρησης του εικονικού φαρμάκου, συγκριτικά με >40 εβδομάδες στην ομάδα συντήρησης του IFX. (p < 0,001).

Θεραπευτικός αλγόριθμος: Επαγωγή και διατήρηση της ύφεσης στην ΕΚ



DDW 2016

Accelerated Dosing of Infliximab Prevents Colectomy Within 90 Days in Only Half of Patients With Severe Ulcerative Colitis

516

Shail M. Govani^{1,2}, Akbar K. Waljee^{1,3}, Ryan W. Stidham¹, Peter Higgins¹, Karin Hardiman⁴

¹ Internal Medicine, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, United States; ² VA Hospital, Ann Arbor, Michigan, United States; ³ VA Center for Clinical Management Research, Ann Arbor, Michigan, United States; ⁴ Surgery, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, United States



- 57 ασθενείς με οξεία σοβαρή ελκώδη κολίτιδα



- 17 ασθενείς έλαβαν τη 2^η δόση IFX 3 ημέρες μετά την 1^η



- CRP < 0.7 mg/dL

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗΣ – ΗΜΕΡΑ 90

