



ΕΠΕΜΥ

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία

anti-CCP....και στην ΨΑ ?

Η παρουσία των ACPA αντισωμάτων φαίνεται, όπως και στην ΡΑ, έτσι **και στην ΨΑ, να σχετίζεται με οστική καταστροφή**, και κάτι τέτοιο σημαίνει ότι η οστεοκαταβολική δράση των αντισωμάτων αυτών δεν περιορίζεται μόνο στην ΡΑ, σύμφωνα με μια πρόσφατη μεγάλη μελέτη παρατήρησης με 1996 ασθενείς με ΨΑ, εκ των οποίων **το 5,3 % ήταν θετικό** για ACPA αντισώματα.

Η παρουσία των αντισωμάτων αυτών σχετίστηκε επίσης με μεγαλύτερο αριθμό οιδηματωδών αρθρώσεων , DAS28 , δακτυλίτιδα και διαβρώσεις

Anti-citrullinated protein antibodies are linked to erosive disease in an observational study of patients with psoriatic arthritis. Frank Behrens^{1,2}, Michaela Koehm^{1,2}, Diamant Thaçi³, Holger Gnann⁴, Gerd Greger⁵, Bianca Maria Wittig⁵ and Harald Burkhardt. **Rheumatology** (2016). doi: 10.1093/rheumatology/kew229. First published online: **June 21, 2016**